

香川県飼料作物奨励品種一覽

(平成18年版)

夏作飼料作物

トウモロコシ

| 早晚性 | 品 種 系 統 名 | 相対熟度 (RM) | 利 用 形 態 | | | 栽植本数(10a) |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|---|---|--------------|
| | | | サ | 乾 | 青 | |
| 早 生 | スノーデント110 (DK567) | 110 | ◎ | | | 6,000~7,000本 |
| | ゆめちから | 115 | ◎ | | | |
| | ロイヤルデント117 (TX230) | 117 | ◎ | | | |
| | サイレージオーンNS118 | 118 | ◎ | | | |
| 中 生 | サイレージオーンNS124 (FC124GP (NS807)) | 124 | ◎ | | | 6,000~6,500本 |
| | ゆめそだち | 125 | ◎ | | | |
| | クミアイデント123 | 123 | ◎ | | | |
| 晩 生 | ロイヤルデント130 (TX150) | 130 | ◎ | | ○ | 5,500~6,000本 |
| | ゴールドデントKD772スーパー | 130 | ◎ | | ○ | |
| | ゆめつよし | 127 | ◎ | | | |

ソルガム

| 形 態 別 | 品 種 名 | 利 用 形 態 | | | 刈取ステージ | 刈 取 回 数 |
|---------------|--------------|---------|---|---|---------|---------|
| | | サ | 乾 | 青 | | |
| スーダングラス | ベールスーダン | ○ | ◎ | ◎ | 出 穂 期 | 2~3回 |
| | ヘイスーダン | ○ | ◎ | | | |
| | ドライスーダンII | ◎ | ◎ | ○ | | |
| | うまかろー | ◎ | ○ | ○ | | |
| スーダン型 ソルガム | キングソルゴ | ○ | | ◎ | 出 穂 期 | 2~3回 |
| | スタックス | ○ | | ◎ | | |
| ソルゴ型 ソルガム | スーパーシュガーソルガム | ◎ | | ◎ | 出穂期~乳熟期 | 1~2回 |
| | クミアイソルガムハチミツ | ◎ | | ○ | | |
| | 甘味ソルゴ | ◎ | | ○ | | |
| 兼 用 型 | ハイグレンソルゴ | ◎ | | ○ | 乳熟期~糊熟期 | 1 回 |
| | マイロソルゴ | ◎ | | ○ | | |
| | 兼月 | ◎ | | ○ | | |

冬作飼料作物

イタリアンライグラス

| 早晚性 | 品 種 名 | 利 用 形 態 | | | 刈取時期 | 刈 取 回 数 | 刈 取 ステージ | 利用期間 |
|-----|--------|---------|---|---|-------|---------|-------------|------|
| | | サ | 乾 | 青 | | | | |
| 極早生 | ミナミアオバ | ◎ | ◎ | ○ | 3月下旬~ | 2~3回 | 出穂期前後 | 短 期 |
| | ウツキアオバ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| | さちあおば | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| | ハナミワセ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| 早 生 | ワセ玉 | ◎ | ◎ | ○ | 4月上旬~ | 2~3回 | 出穂期前後 | 短 期 |
| | タチワセ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| | ワセアオバ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| 中 生 | テティラ | ◎ | | ◎ | 4月中旬~ | 1~2回 | 出穂期前後 | 長 期 |
| | ヒタチヒカリ | ◎ | ○ | ◎ | | | | |
| 晩 生 | タチムシャ | ◎ | ◎ | ○ | | | | |

エンバク

| 早晚性 | 品 種 名 | 利 用 形 態 | | | 刈取時期 | 刈 取 ステージ | 備 考 |
|-----|------------|---------|---|---|-------|-------------|------------------|
| | | サ | 乾 | 青 | | | |
| 極早生 | 極早生スプリンター | ◎ | ○ | ○ | 5月中旬~ | 糊 熟 期 | 極早生種は晩夏播きで年内利用可能 |
| | ニューウエスト | ◎ | ◎ | ○ | | | |
| 早 生 | ハイオーツ | ◎ | ◎ | ○ | 4月中旬~ | 出 穂 期 | |
| | スタンドオーツ | ◎ | | ◎ | | | |
| 中 生 | ニューオールマイティ | ◎ | | ○ | 5月中旬~ | 乳熟期~糊熟期 | |

ライ麦・大麦

| 草 種 名 | 早晚性 | 品 種 名 | 利 用 形 態 | | | 刈取時期 | 刈 取 ステージ |
|-------|-----|---------|---------|---|---|-------|---------------|
| | | | サ | 乾 | 青 | | |
| ライ麦 | 極早生 | 春一番 | ◎ | ◎ | ◎ | 3月下旬~ | 穂ばらみ期~ 出穂期 |
| | | ハルミドリ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | 改良ライコーン | ◎ | ○ | ○ | | |
| 大 麦 | 極早生 | 飼料用2条大麦 | ◎ | ○ | ○ | 4月中旬~ | 糊 熟 期 |
| | | ワセドリ2条 | ◎ | ◎ | ○ | | |

(注) いずれの草種も、普通作栽培を前提としており、データはそれぞれの種苗会社カタログを参考とした。

利用形態の、「サ」はサイレージ、「乾」は乾草、「青」は青刈の略で、形態別適性は、◎：最適、○：適を示した。